

# Quarantäne-Regeln ab dem 12.01.2022

**Infizierte**  
(unabhängig vom Impfstatus)  
(alle Varianten)

**10 Tage**  
(Verkürzungsmöglichkeit an Tag 7 der Quarantäne mittels PCR oder Schnelltest, wenn mind. 48 Stunden symptomfrei)

**Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen etc.**  
**10 Tage**  
(Verkürzungsmöglichkeit an Tag 7 der Quarantäne mittels PCR Test)  
– kein Schnelltest oder Selbsttest

**enge Kontaktperson**  
(alle Varianten)

Geboostert, frisch doppelt Geimpfte, frisch Genesene, geimpfte Genesene \*

keine Quarantäne

Allgemein (auch für Heimbewohnende)

**10 Tage**  
(Verkürzungsmöglichkeit an Tag 7 der Quarantäne mittels PCR oder Schnelltest)  
– kein Selbsttest

Schüler: innen und Kitakinder

**10 Tage**  
(Verkürzungsmöglichkeit an Tag 5 der Quarantäne mittels PCR oder Schnelltest)  
– kein Selbsttest  
**Kita:** Clustern

Lehrkräfte und Erzieher

**10 Tage**  
(Verkürzungsmöglichkeit an Tag 7 der Quarantäne mittels PCR oder Schnelltest)  
– kein Selbsttest

\*

Grundimmunisierung:		Booster:
Erstimpfung	Zweitimpfung	Boosterimpfung
Genesung (unabhängig davon, wann die Erkrankung war)	Impfung	Boosterimpfung
Erstimpfung	Genesung (unabhängig davon, wann die Erkrankung war)	Boosterimpfung
Erstimpfung	Zweitimpfung	Genesung (unabhängig davon, wann die Erkrankung war)

Johnson&Johnson	-	Boosterimpfung
Johnson&Johnson	-	Genesung

Frisch doppelt Geimpfte bzw. frisch Genesene:  
Wenn die Erkrankung / Impfung weniger als 3 Monate zurückliegt.

**Ausnahme 1:**  
Wenn ABIT durchgeführt wird: keine Quarantäne

**Ausnahme 2:**  
Wenn Person geboostert, frisch doppelt geimpft, frisch genesen oder geimpft genesen: keine Quarantäne

**Indexfall in der Schule:** Mitschüler müssen sich ab dem nächsten Schultag nach Bekanntwerden des positiven Befunds 5 Schultage selbst testen. Den Lehrkräften wird empfohlen die ABIT ebenfalls durchzuführen.

**Indexfall in der Kita:** Für die betroffene Gruppe wird eine freiwillige ABIT an den 5 folgenden Präsenztagen nach Bekanntwerden des positiven Befunds empfohlen. Dem Personal der betroffenen Gruppe wird empfohlen sich an dieser Testung zu beteiligen.